

VÍDEO ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (TARDE)

Caro Paciente, para a realização da Video Endoscopia Digestiva Alta é necessário seguir as determinações descritas abaixo, para que o resultado seja o mais preciso possível.

- **24h ANTES DO EXAME:** Não ingerir leite nem derivados;
- **CAFÉ DA MANHÃ:** ATÉ AS 05:30h DA MANHÃ, se alimentar apenas com: 1 xícara de chá de cor clara e 03 biscoitos de água e sal pura, sem acompanhamentos como manteiga, margarina, requeijão entre outros. Após este horário, **FAZER JEJUM DE 8h DE ALIMENTOS SÓLIDOS**;
- **04 HORAS ANTES DO EXAME:** JEJUM ABSOLUTO inclusive de água;
- **SE O PACIENTE É PORTADOR DE DOENÇA DE CHAGAS:** deverá iniciar o preparo com **DIETA LÍQUIDA 03 DIAS ANTES DO EXAME. (TODO ALIMENTO SÓLIDO DEVE SER BATIDO NO LIQUIDIFICADOR E COADO EM PENEIRA ANTES DO CONSUMO).**
- **IMPORTANTE ressaltar que,** caso apresente na véspera do exame, sintomas gripais como coriza, tosse, febre e espirros, remarcar o exame para 4 semanas após a melhora.

ATENÇÃO PARA AS ORIENTAÇÕES ABAIXO E DAS MEDICACÕES NO VERSO DA PÁGINA:

- **PESO MÁXIMO PARA REALIZAÇÃO DO EXAME:** 170kg, acima disso, realização em centro cirúrgico.
- Medicamentos para **HIPERTENSÃO** (Pressão alta) e **ANTICONVULSIVANTES** devem ser tomados com água o mais cedo possível. Quem usa “bombinha” para asma deverá usar normalmente. Outros medicamentos somente após o exame.
- **É NECESSÁRIO QUE O PACIENTE ESTEJA ACOMPANHADO POR UM ADULTO COM PLENA CONDIÇÃO MOTORA**, e que o mesmo esteja ciente de todas as informações contidas no termo de consentimento e possíveis cobranças adicionais descritas no mesmo, além de permanecer na clínica durante toda a realização do exame do paciente. Um acompanhante por paciente.
- **O PACIENTE NÃO DEVE TRAZER OU USAR OBJETOS DE VALOR TAIS COMO:** dinheiro, carteiras, bolsas, brincos, pulseiras, relógios, piercing e etc. Caso traga, deverá deixar com seu acompanhante. O CENTRO MÉDICO MATSUMOTO não se responsabiliza por perda ou extravio de objetos. **Não usar:** tamancos, sapatos de salto alto, batom e esmalte escuro.
- **ATENÇÃO:** Proibido entrar em salas de exames e procedimentos portando arma de fogo. Mais prudente deixar em casa.
- **TRAZER OS EXAMES RECENTES:** cardiológicos, exames de sangue, nomes de todos os medicamentos em uso e exames de imagem recentes (RX, Ressonâncias, tomografias, Clister Opaco, endoscopia e colonoscopia).
- Não será fornecido ATESTADO MÉDICO para acompanhante, somente ATESTADO DE COMPARECIMENTO.
- Chegar com 15 minutos de antecedência.

**MEDICAMENTOS A SEREM SUSPENSOS COM CONCORDÂNCIA
DO SEU MÉDICO:**

SUSPENDER SOMENTE NO DIA DO EXAME:

- METFORMINA (Glifage);
- PIOGLITAZONA (Stanglit);
- GLIBENCLAMIDA (Daonil/Glioni).

SUSPENDER 1 DIA ANTES DO EXAME:

- ALOGLIPTINA (Nesina);
- ENOXAPARINA (Clexane/Versa/Heparinox/Cutenox);
- NADROPARINA (Fraxiparine).

SUSPENDER 2 DIAS ANTES DO EXAME:

- ABCIXIMABE (Reopro) - Se você tiver doença renal, deverá suspender esse medicamento 5 dias antes;
- CILOSTAZOL (Vasogard);
- DIPIRIDAMOL (Persantin);
- RIVAROXABANA (Xarelto);
- APIXABANA (Eliquis);
- DAGIGATRANA (Pradaxa);
- FONDAPARINUX (Arixtra);
- SAVAYSA (Endoxaban).

SUSPENDER 3 DIAS ANTES DO EXAME:

- LIRAGLUTIDA/DEGLUDECA (Victoza/Saxenda/Xultophy)
- DAPAGLIFLOZINA (Forxiga/Xigduo)
- EMPAGLIFLOZINA (Jardiance/Glyxambi)

SUSPENDER 7 DIAS ANTES DO EXAME:

- AAS (Aspirina/Bufferin/Somalgin/Salicetil);
- VARFARINA (Marevan/Coumadin/Marfarin/Warfarin);
- FEMPROCUMONA (Marcu-Mar);
- TIROFIBANA (Agrastat);
- TICAGRELOR (Brilinta/Tiag/Coaly);
- GINKOBILOBA;
- CLOPIDOGREL (Plavix/Clopidax/Plaq/Clopin/Cuore/Iscover);
- PRASUGREL (Effient);

SUSPENDER 10 DIAS ANTES DO EXAME:

- DULAGLUTIDA (Trulicity);

SUSPENDER 15 DIAS ANTES DO EXAME:

- TICLOPIDINA (Ticlid/Plavasc/Plaketar)

SUSPENDER 21 DIAS ANTES DO EXAME:

- SEMAGLUTIDA (Ozempic);
- TIRZEPATIDA (Mounjaro).